低侵襲治療

開腹せず、体外から衝撃波を当てて結石を小さく破砕し、尿管から膀胱に排泄させ除去します。また、全身麻酔が不要なため、体に負担の少ない治療法です。

腎・尿管問わず治療が可能

砂状になった結石は尿とともに体外に排泄されます。排泄までの期間は数日程度から 2~3 ヶ月ほどです。

治療時間が短い

１回の手術時間は１時間前後で、日帰りもしくは一泊入院での治療が可能です。

アクセス
Access

お車をご利用の方

首都高速池袋 5 号線「板橋本町 IC」出口より中山道陸橋交差点そば　環七通り沿い
※駐車場 15 台完備

公共交通機関をご利用の方

電車をご利用の場合
　都営三田線　板橋本町駅 A2 出口となり

バスをご利用の場合
　国際興業バス　大和町下車各バス停より徒歩 5 分
　①…池 20 / 池 20-2 / 池 20-3 、池 21、赤 51 / 赤 57
　②…池 20 / 池 21、赤 51 / 赤 57 / 赤 97、
　③…王 54 / 王 54-2、赤 31
　④…王 54 、赤 31 / 赤 31-2

IMS〈イムス〉グループ　医療法人財団 明理会
明理会東京大和病院

〒173-0001 東京都板橋区本町 36-3
月 - 土 午前　8：00-11：00（11：30）
月 - 金 午後　13：00-16：00（16：30）

電話でのご予約・お問い合わせ
tel. 03-5943-2411

Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy

ESWL

体外衝撃波結石破砕
治療のご案内

IMS〈イムス〉グループ　医療法人財団 明理会
明理会東京大和病院

鎮痛剤のみでの治療が可能

5 ～ 10 ㎜までの結石に対応



結石破砕の治療経過

- 治療中に鈍く響くような痛みを感じることがあります。
- 砂状になった結石は尿とともに体外に排泄されます。
- もっとも早い時期であれば、治療当日から尿の中に混じって出てきます。
- 個人差にもよりますが、数日程度から 2 ～ 3 ヶ月要する場合もあります。
- 1 回の治療で全て砕ききれない場合は、数週間後に複数回治療を行います。

モデュリス SLX-F2

- 焦点サイズが可変なため、結石の大きさに合わせたエネルギー分布が得られます。
- X 線と衝撃波が同じ方向を向いているので、結石を高い確率で捕らえることができます。

治療費用

3 割負担の場合 / 日帰り…約 70,000 円、一泊入院…約 80,000 円

- 後期高齢者医療制度、各種医療証をお持ちの方の診療費については別途お問い合わせください。
- 治療内容や入院期間、お部屋タイプ等により料金は異なります。
- 上記治療費には食事代も含まれています。

患者様一人ひとりの条件に応じた治療の提案を

治療実績の多さ、待機期間の短さ

当院の結石破砕センターは旧大和病院において 1986 年からこれまでに多数の実績を残しています。当院では患者さまの結石の大きさ、数、部位等の条件に応じて治療法をご提案していますが、その選択肢のひとつがこの体外衝撃波結石破砕術（ESWL）で、導入機種はモデュリス SLX-F2（ストルスメディカル社製）です。
また、緊急時、ご希望の日程等にできる限り対応可能な体制を整えています。今後も、この経験と実績を生かして、経験豊富なスタッフと共に、さらに有効な治療を提供できるよう努力して参ります。

山本　隆次（Yamamoto Ryuji）
日本泌尿器科学会専門医 / 指導医